

使用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

小切傷・すりきず・さかむけ・あかぎれに!!

第3類医薬品

# コロスキん®

(液状絆創膏)

コロスキんは、小切傷・すりきず・さかむけ（ささくれ）・あかぎれなどにぬると一瞬しみますが、すぐに透明な被膜を作り、傷をホコリやバイキンから守ります。被膜は炊事、洗濯などの水仕事でもはがれにくいので、コロスキんはホータイのいらぬ傷ぐすりです。

## 〈使用上の注意〉

❌してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）  
次の部位には使用しないで下さい

- (1)ただれ、化膿、多量出血している患部、傷口の大きい患部
- (2)目の周囲、顔面、頭部、粘膜等
- (3)ひげそり、除毛、脱毛等により傷んだ皮膚

## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい  
(1)本人又は家族がアレルギー体質の人  
(2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい  
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、熱感等

## 効 能・効 果

小切傷、すりきず、さかむけ、あかぎれ

## 用 法・用 量

患部を清潔にし、傷部のみに適量を塗り、そのまま静かに乾燥させて下さい

## 用法・用量に関連する注意

- ①目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科で受診して下さい
- ②塗布後の部位を火気に近づけないで下さい
- ③小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい
- ④外用にのみ使用し、内服しないで下さい

## 使 用 方 法

- ・キャップのとがっている先を利用してチューブに穴をあけて下さい
- ・キャップが取れないときは、口元を熱湯につけると取れます（直接火気で温めないで下さい）
- ・患部が血や水でぬれていたたり、またクリーム、乳液など油脂分があるとコロスキんがつかまませんので、使用前によく拭き取って下さい
- ・入浴または水仕事を重ねる間に、周りから剥がれてきますが、急いで剥がしたいときは、マニキュアの除光液（エナメルリムーバー）で溶かしながら拭き取って下さい

## 成 分・分 量

100g中

ピロキシリン……15.95g d-カンフル……2.80g  
添加物としてベンジルアルコール、イソプロパノール、ヒマシ油、酢酸エチルその他1成分を含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しいところに、密栓して保管して下さい
- (2)小児の手の届かないところに保管して下さい
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4)火気に近づけないで下さい
- (5)使用後は、紙または布でチューブの口をよく拭き、必ずキャップをして下さい
- (6)有機溶剤が含まれているので、故意に吸わないで下さい
- (7)衣服、家具、床等につくと、非常に取れにくく、色調に変化をきたす恐れがありますので、使用の際は十分に注意して下さい
- (8)外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい

## 〈問い合わせ先〉

①購入した薬局、薬店

②製造販売

株式会社 東京甲子社

住所 東京都千代田区岩本町3-10-9

電話 03-3862-4081

受付時間 9時～17時まで（土、日、祝日を除く）